薬局用・病棟用

化学療法指示書

wnab-PTX+Rmab　day1, 15

＜対象疾患＞切除不能・再発胃癌　二次治療

治療内容（1クール期間：28日　wPTX　day1.8.15、Rmab day1.15　　総クール数：PDまで）

ID：@PATIENTID　　患者氏名：@PATIENTNAME　　医師：@ACTIVEUSERNAME

年齢(歳)：@PATIENTAGEYI　　性別：@PATIENTSEXN

身長(cm)：@REF_HEIGHT_0　　体重(kg)：@REF_WHEIG　　体表面積(m^2)：

クール数：　　回目　　投与開始日：

day 1, 15

※ボトル②開始と同時にレスタミンコーワ錠10mg5錠内服

本体　側管

ボトル①

ボトル①　ルートキープ・フラッシュ用	
生理食塩水（50mL）	1 本

↓

ボトル②

30分

ボトル②　点滴静注	
デカドロン（3.3mg/1mL）	2 A
ガスター（20mg/2mL）	1 A
生理食塩水（50mL）	1 本

↓

ボトル③

60分
（2回目以降は30分可）

ボトル③　点滴静注	
生理食塩水（250mL）	250 mL
サイラムザ（100mg/10mL）	＿＿ mg
サイラムザ（500mg/50mL）	＿＿ mg
【　標準量　8 mg/kg：　##### mg　】	

↓

ボトル①

全開

ボトル①
ボトル①の生理食塩水でフラッシュ

↓

※2クールまではサイラムザ投与後から
アブラキサン投与までの間に1時間観察

ーーーー以降はフィルターなしの輸液セットを使用（上記輸液セットのフィルターより下につなぐ）ーーーーーー

ボトル④

ボトル④　ルートキープ・フラッシュ用	
生理食塩水（50mL）	1 本

↓

ボトル⑤

30分

ボトル⑤　点滴静注	
生理食塩水（50mL）	1 本
アブラキサン（100mg）	＿＿ mg
【　標準量　100 mg/m^2：　##### mg】	

↓

ボトル④

全開

ボトル④
ボトル④の生理食塩水でフラッシュ

【医師のコメント】

【薬剤師のコメント】

・使用するケモセーフロック
　ボトル③　バックスパイク×1、バイアルアダプター×必要分、コネクター×必要分
　ボトル⑤　バックスパイク×1
・注意点
　ボトル③　全量250mLとする
　ボトル⑤　フィルター使用不可。針は18G。100mgあたり20mLの生理食塩水で溶解
　特定生物由来製品のため、血液製剤などと同様に投与に関する記録を20年間保管する義務がある

調製者	監査者