薬局用・病棟用

化学療法指示書

wPTX+Rmab　day1, 15

＜対象疾患＞切除不能・再発胃癌　二次治療

治療内容（1クール期間：28日　wPTX　day1.8.15、Rmab day1.15　　総クール数：PDまで）

ID：@PATIENTID　　患者氏名：@PATIENTNAME　　医師：@ACTIVEUSERNAME

年齢(歳)：@PATIENTAGEY　　性別：@PATIENTSEXN

身長(cm)：@REF_HEIGHT_0　　体重(kg)：@REF_WHEIC　　体表面積(m^2)：

クール数：　　回目　　投与開始日：

day 1, 15

※ボトル②開始と同時にレスタミンコーワ錠10mg5錠内服

本体　側管

ボトル①

ボトル①　ルートキープ・フラッシュ用	
生理食塩水（50mL）	1 本

ボトル②

30分

ボトル②　点滴静注	
デカドロン（3.3mg/1mL）	2 A
ガスター（20mg/2mL）	1 A
生理食塩水（50mL）	1 本

ボトル③

60分
（2回目以降は30分可）

ボトル③　点滴静注		
生理食塩水（250mL）	250 mL	
サイラムザ（100mg/10mL）		mg
サイラムザ（500mg/50mL）		mg
【　標準量　8 mg/kg：　##### mg】		

※2クールまではサイラムザ投与後からパクリタキセル投与までの間に1時間観察

ボトル④

全開

ボトル④　フラッシュ用	
生理食塩水（50mL）	1 本

ボトル⑤

60分

ボトル⑤　点滴静注		
生理食塩水（250mL）	1 本	
パクリタキセル（100mg/16.7mL）		mg
【　標準量　80 mg/m^2：　#####　】		

ボトル①

ボトル①
ボトル①の生理食塩水でフラッシュ

【医師のコメント】

【薬剤師のコメント】

・使用するケモセーフロック
　ボトル③、④　バッグスパイク×1
　ボトル⑤　バッグスパイク×1、バイアルアダプター×必要分、コネクター×必要分

調製者	監査者