薬局用・病棟用/外来用

化学療法指示書

biweekly−FTD/TPI+Bmab

＜対象疾患＞切除不能進行・再発の結腸・直腸がん
治療内容（1クール期間：28日・総クール数：PDまで）

ID：@PATIENTID　患者氏名：@PATIENTNAME　医師：@ACTIVEUSERNAME
年齢(歳)：@PATIENTAGEYI　性別：@PATIENTSEXN
身長(cm)：@REF_HEIGHT_01　体重(kg)：@REF_WHEIC　体表面積(m^2)：

クール数：　回目　投与開始日：

day 15

本体	側管

ボトル①

ボトル①　ルートキープ・フラッシュ用	
生理食塩水（50mL）	1 本

ボトル②

初回90分
2回目60分
3回目以降30分

ボトル②　点滴静注		
生理食塩水（100mL）	1 本	
ベバシズマブ（400mg/16mL）		mg
ベバシズマブ（100mg/4mL）		mg
【 標準量	5 mg/kg：	###### mg】

ボトル①

ボトル①	
ボトル①　の生理食塩水でフラッシュ	

【医師のコメント】

【薬剤師のコメント】
ボトル②　バックスパイク×1

調製者	監査者

ロンサーフ減量基準

前コース(休薬期間を含む)中に、「減量基準」に該当する有害事象が発現した場合には、本剤の投与再開時において、コース単位で1日単位量として10mg/日単位で減量する。ただし、最低投与量は30mg/日までとする。50mg/日を投与する場合は、朝食後に20mgを、夕食後に30mgを投与する。

	減量基準
好中球数	500/mm^{3}未満
血小板数	50,000/mm^{3}未満

(参考)ロンサーフ配合錠　添付文書