薬局用・病棟用

化学療法指示書

CAPIRI(Capecitabine+CPT-11)+Bmab

＜対象疾患＞切除不能進行・再発の結腸・直腸がん
治療内容（1クール期間：21日・総クール数：PDまで）

ID：@PATIENTID　患者氏名：@PATIENTNAME　医師：@ACTIVEUSERNAME
年齢(歳)：@PATIENTAGEYE　性別：@PATIENTSEXN
身長(cm)：@REF_HEIGHT_01　体重(kg)：@REF_WHEIG　体表面積(m^2)：

クール数：　回目　投与開始日：

day 1

本体　側管

ボトル①

ボトル①　ルートキープ・フラッシュ用	
生理食塩水（50mL）	1 本

ボトル②

30分

ボトル②　点滴静注	
パロノセトロン（0.75mg/50mL）	1 袋
デカドロン（3.3mg/1mL）	2 A

ボトル③

初回90分
2回目60分
3回目以降30分

ボトル③　点滴静注		
生理食塩水（100mL）		1 本
ベバシズマブ（400mg/16mL）		mg
ベバシズマブ（100mg/4mL）		mg
【 標準量	7.5 mg/kg：	###### mg】

ボトル④

90分

ボトル④　点滴静注		
5%ブドウ糖（250mL）		1 本
イリノテカン（100mg/5mL）		mg
イリノテカン（40mg/2mL）		mg
【 標準量	200 mg/m^2：	###### mg】

ボトル①

ボトル①
ボトル①の生理食塩水でフラッシュ

<u>day 1昼食後～day 5朝食後</u>
・炭酸水素ナトリウム（重曹）　1.5g　分3毎食後
・半夏瀉心湯エキス顆粒　3包 分3　毎食前
・ウルソデオキシコール酸錠100mg　3錠　分3　毎食後
・マグミット錠330mg　3錠　分3　毎食後

<u>day 1夕食後～day 15朝食後</u>
カペシタビン錠300mg　　錠 分2　朝・夕食後

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌には他の抗悪性腫瘍剤との併用でC法又はE法を使用する。
カンプトとの併用の場合はE法を推奨

E法

体表面積	1回用量
1．31m2未満	900mg
1．31m2以上1．69m2未満	1，200mg
1．69m2以上2．07m2未満	1，500mg
2．07m2以上	1，800mg

（参考）ゼローダ錠インタビューフォーム

【医師のコメント】

【薬剤師のコメント】
・使用するケモセーフロック
ボトル③　バッグスパイク×1
ボトル④　バイアルアダプター×必要分、コネクター×必要分、バッグスパイク×1

調製者	監査者