薬局用・病棟用

# 化学療法指示書
# CAPOX(Capecitabine+L-OHP)

＜対象疾患＞切除不能進行・再発の結腸・直腸がん
治療内容（1クール期間：21日・総クール数：PDまで）

ID：@PATIENTID　患者氏名：@PATIENTNAME　医師：@ACTIVEUSERNAME
年齢(歳)：@PATIENTAGEYE　性別：@PATIENTSEXN
身長(cm)：@REF_HEIGHT_01　体重(kg)：@REF_WHEIG　体表面積($m^2$)：

クール数：　回目　投与開始日：

**day 1**

本体　側管

ボトル①

| ボトル①　ルートキープ・フラッシュ用 | |
|---|---|
| 生理食塩水（50mL） | 1 本 |

ボトル②

**30分**

| ボトル②　点滴静注 | |
|---|---|
| パロノセトロン（0.75mg/50mL） | 1 袋 |
| デカドロン（3.3mg/1mL） | 2 A |

ボトル③

**120分**

| ボトル③　点滴静注 | | |
|---|---|---|
| 5%ブドウ糖（250mL） | 1 本 | |
| オキサリプラチン（200mg/40mL） | | mg |
| オキサリプラチン（100mg/20mL） | | mg |
| オキサリプラチン（50mg/10mL） | | mg |
| 【 標準量 | 130 mg/$m^2$： | ###### mg】 |

ボトル①

| ボトル① |
|---|
| ボトル①の生理食塩水でフラッシュ |

day 1夕食後～day 15朝食後　カペシタビン錠300mg　　錠 分2　朝・夕食後

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌には他の抗悪性腫瘍剤との併用でC法又はE法を使用する。
オキサリプラチンとの併用の場合はC法を推奨

**C法**

| 体表面積 | 1回用量 |
|---|---|
| 1．36m2未満 | 1，200mg |
| 1．36m2以上1．66m2未満 | 1，500mg |
| 1．66m2以上1．96m2未満 | 1，800mg |
| 1．96m2以上 | 2，100mg |

（参考）ゼローダ錠インタビューフォーム

【医師のコメント】

【薬剤師のコメント】

・使用するケモセーフロック
　ボトル③　バイアルアダプター×必要分、コネクター×必要分、バッグスパイク×1
　ボトル④　バッグスパイク×1

| 調製者 | 監査者 |
|---|---|
| | |