薬局用・病棟用

化学療法指示書

FOLFIRI(5-FU+l-LV+CPT-11)+Rmab

＜対象疾患＞切除不能進行・再発の結腸・直腸がん
治療内容（1クール期間：14日・総クール数：PDまで）

ID：@PATIENTID　患者氏名：@PATIENTNAME　医師：@ACTIVEUSERNAME
年齢(歳)：@PATIENTAGEYE　性別：@PATIENTSEXN
身長(cm)：@REF_HEIGHT_01　体重(kg)：@REF_WHEIG　体表面積(m^2)：
クール数：　回目　投与開始日：

day 1

本体　側管

ボトル①

ボトル①　ルートキープ・フラッシュ用
生理食塩水（50mL）　1 本

ボトル②

30分

ボトル②　点滴静注
パロノセトロン（0.75mg/50mL）　1 袋
ポララミン（5mg/1mL）　2 A
デカドロン（3.3mg/1mL）　3 A

ボトル③

初回60分
2回目以降30分

ボトル③　点滴静注
生理食塩水（250mL）　250 mL
サイラムザ（100mg/10mL）　　mg
サイラムザ（500mg/50mL）　　mg
【 標準量　8 mg/kg：　###### mg】

ボトル④

全開

ボトル④　フラッシュ用
生理食塩水（50mL）　1 本

ボトル⑤

90分

ボトル⑤　点滴静注
5%ブドウ糖（250mL）　1 本
カンプト（100mg/5mL）　　mg
カンプト（40mg/2mL）　　mg
【 標準量　180 mg/m^2：　###### mg】

ボトル⑥

120分

ボトル⑥　点滴静注
5%ブドウ糖（250mL）　1 本
アイソボリン（25mg）　　mg
アイソボリン（100mg）　　mg
【 標準量　200 mg/m^2：　###### mg】

ボトル⑦

全開

ボトル⑦　点滴静注
生理食塩水（50mL）　1 本
フルオロウラシル（250mg/5mL）　　mg
フルオロウラシル（1000mg/20mL）　　mg
【 標準量　400 mg/m^2：　###### mg】

ボトル⑧

46時間

ボトル⑧　インフューザーポンプ使用
生理食塩水（100mL）　1 本
フルオロウラシル（250mg/5mL）　　mg
フルオロウラシル（1000mg/20mL）　　mg
※総量が100mLとなるように生食を調整する
【 標準量　2400 mg/m^2：　###### mg】

ボトル⑤とボトル⑥は同時投与

day 1昼食後～day 5朝食後
・炭酸水素ナトリウム（重曹）　1.5g　分3毎食後
・半夏瀉心湯エキス顆粒　3包 分3　毎食前
・ウルソデオキシコール酸錠100mg　3錠　分3　毎食後
・マグミット錠330mg　3錠　分3　毎食後

【医師のコメント】

【薬剤師のコメント】
・使用するケモセーフロック
ボトル③　バッグスパイク×1
ボトル④　バッグスパイク×1
ボトル⑤　バイアルアダプター×必要分、コネクター×必要分、バッグスパイク×1
ボトル⑦　バイアルアダプター×必要分、コネクター×必要分、バッグスパイク×1

調製者	監査者