薬局用・病棟用

化学療法指示書
IRIS(S-1+CPT-11)

＜対象疾患＞切除不能進行・再発の結腸・直腸がん
治療内容(1クール期間:28日・総クール数:PDまで)

ID: @PATIENTID　患者氏名: @PATIENTNAME　医師: @ACTIVEUSERNAME
年齢(歳): @PATIENTAGEYI　性別: @PATIENTSEXN
身長(cm): @REF_HEIGHT_0　体重(kg): @REF_WHEIG　体表面積(m^2):

クール数:　回目　投与開始日:

day 1,15

本体 | 側管

ボトル①

ボトル①　ルートキープ・フラッシュ用	
生理食塩水(50mL)	1 本

ボトル②

30分

ボトル②　点滴静注	
パロノセトロン(0.75mg/50mL)	1 袋
デカドロン(3.3mg/1mL)	2 A

ボトル③

90分

ボトル③　点滴静注		
5%ブドウ糖(250mL)	1 本	
イリノテカン(100mg/5mL)		mg
イリノテカン(40mg/2mL)		mg
【 標準量	100 mg/m^2:	###### mg】

ボトル④

全開

ボトル④　フラッシュ用	
生理食塩水(50mL)	1 本

day 1昼食後～day 5朝食後、day 15昼食後～day 19朝食後

・炭酸水素ナトリウム(重曹)　1.5g　分3毎食後
・メトクロプラミド錠5mg　3錠　分3毎食後

day 1夕食後～day 15朝食後

エスワンタイホウ配合OD錠(20mg)　　錠 分2　朝・夕食後
エスワンタイホウ配合OD錠(25mg)　　錠 分2　朝・夕食後

体表面積	初回基準量(テガフール相当量)
1．25m2未満	40mg／回
1．25m2以上1．5m2未満	50mg／回
1．5m2以上	60mg／回

(参考)エスワンタイホウ錠インタビューフォーム

【医師のコメント】

【薬剤師のコメント】
・使用するケモセーフロック
ボトル③　バイアルアダプター×必要分、コネクター×必要分、バッグスパイク×1
ボトル④　バッグスパイク×1

調製者	監査者