薬局用・病棟用

化学療法指示書
IRIS(S-1+CPT-11)

＜対象疾患＞切除不能進行・再発の結腸・直腸がん
治療内容(1クール期間:28日・総クール数:PDまで)

ID: @PATIENTID　患者氏名: @PATIENTNAME　医師: @ACTIVEUSERNAME
年齢(歳): @PATIENTAGEYI　性別: @PATIENTSEXN
身長(cm): @REF_HEIGHT_0　体重(kg): @REF_WHEIG　体表面積(m^2):

クール数:　回目　投与開始日:

day 15

本体 | 側管

ボトル①

ボトル①　ルートキープ・フラッシュ用	
生理食塩水(50mL)	1 本

ボトル②

30分

ボトル②　点滴静注	
パロノセトロン(0.75mg/50mL)	1 袋
デカドロン(3.3mg/1mL)	2 A

ボトル③

90分

ボトル③　点滴静注		
5%ブドウ糖(250mL)	1 本	
イリノテカン(100mg/5mL)		mg
イリノテカン(40mg/2mL)		mg
【 標準量	100 mg/m^2:	###### mg】

ボトル①

ボトル①
ボトル①の生理食塩水でフラッシュ

day 15昼食後～day 19朝食後

・炭酸水素ナトリウム(重曹)　1.5g　分3毎食後
・半夏瀉心湯エキス顆粒　3包 分3　毎食前
・ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg　3錠　分3　毎食後
・マグミット錠330mg　3錠　分3　毎食後

【医師のコメント】

【薬剤師のコメント】
・使用するケモセーフロック
　ボトル③　バイアルアダプター×必要分、コネクター×必要分、バッグスパイク×1

調製者	監査者