薬局用・病棟用

化学療法指示書

mFOLFOX6(5-FU+l-LV+L-OHP)+Bmab

＜対象疾患＞切除不能進行・再発の結腸・直腸がん
治療内容（1クール期間：14日・総クール数：PDまで）

ID：@PATIENTID　患者氏名：@PATIENTNAME　医師：@ACTIVEUSERNAME
年齢(歳)：@PATIENTAGEY　性別：@PATIENTSEXN
身長(cm)：@REF_HEIGHT_(　体重(kg)：@REF_WHEIC　体表面積(m^2)：
クール数：　回目　投与開始日：

day 1

本体 | 側管

ボトル①

ボトル① ルートキープ・フラッシュ用
生理食塩水（50mL） 1 本

ボトル②
30分

ボトル② 点滴静注
パロノセトロン（0.75mg/50mL） 1 袋
デカドロン（3.3mg/1mL） 2 A

ボトル③
初回90分
2回目60分
3回目以降30分

ボトル③ 点滴静注
生理食塩水（100mL） 1 本
ベバシズマブ（400mg/16mL） mg
ベバシズマブ（100mg/4mL） mg
【 標準量 5 mg/kg： ###### mg】

ボトル④とボトル⑤は同時投与

ボトル④
120分

ボトル④ 点滴静注
5%ブドウ糖（250mL） 1 本
オキサリプラチン（200mg/40mL） mg
オキサリプラチン（100mg/20mL） mg
オキサリプラチン（50mg/10mL） mg
【 標準量 85 mg/m^2： ###### mg】

ボトル⑤
120分

ボトル⑤ 点滴静注
5%ブドウ糖（250mL） 1 本
アイソボリン（25mg） mg
アイソボリン（100mg） mg
【 標準量 200 mg/m^2： ###### mg】

ボトル⑥
全開

ボトル⑥ 点滴静注
生理食塩水（50mL） 1 本
フルオロウラシル（250mg/5mL） mg
フルオロウラシル（1000mg/20mL） mg
【 標準量 400 mg/m^2： ###### mg】

ボトル⑦
46時間

ボトル⑦ インフューザーポンプ使用
生理食塩水（100mL） 1 本
フルオロウラシル（250mg/5mL） mg
フルオロウラシル（1000mg/20mL） mg
※総量が100mLとなるように生食を調整する
【 標準量 2400 mg/m^2： ###### mg】

【医師のコメント】

【薬剤師のコメント】
・使用するケモセーフロック
ボトル③ バッグスパイク×1
ボトル④ バイアルアダプター×必要分、コネクター×必要分、バッグスパイク×1
ボトル⑥ バイアルアダプター×必要分、コネクター×必要分、バッグスパイク×1

調製者	監査者