薬局用・病棟用・処置室用

化学療法指示書
TC（DTX+CPA）

＜対象疾患＞乳癌

治療内容（1クール期間：21日・総クール数：4回）

ID：@PATIENTID　患者氏名：@PATIENTNAME　医師：@ACTIVEUSERNAME

年齢(歳)：@PATIENTAGEYE.　性別：@PATIENTSEXN

身長(cm)：@REF_HEIGHT_01　体重(kg)：@REF_WHEIC　体表面積(m^2)：

クール数：　回目　投与開始日：

day

本体	側管

ボトル①

ボトル①　ルートキープ・フラッシュ用	
生理食塩水（50mL）	1 V

ボトル②

30分

ボトル②　点滴静注	
パロノセトロン（0.75mg/50mL）	1 袋
デカドロン（3.3mg/1mL）	2 A

ボトル③

60分

ボトル③　点滴静注	
5%ブドウ糖（250mL）	1 袋
ドセタキセル（80mg/4mL）	mg
ドセタキセル（20mg/1mL）	mg
【 標準量　75 mg/m^2：　###### mg】	

ボトル④

30分

ボトル④　点滴静注	
生理食塩水（100mL）	1 V
エンドキサン（500mg）	mg
【 標準量　600 mg/m^2：　###### mg】	

day 2、3、4

デカドロン錠（4mg）　2錠　分2　朝・昼食後　　※ドセタキセルの浮腫予防

【医師の指示】

【薬剤師のコメント】

★使用するケモセーフロック★
・ボトル③・・・バッグスパイク（ドセタキセルを輸液に混注後に装着する）
・ボトル④・・・コネクター、バイアルアダプター、バッグスパイク
★薬剤調整時の注意★
・エンドキサンは100mgあたり5mLの輸液で溶解する。なかなか溶けないので注意する。

調製者	監査者