薬局用・病棟用・処置室用

化学療法指示書
フェスゴ配合皮下注(初回) +DTX

＜対象疾患＞HER2陽性の乳癌

治療内容(1クール期間:21日、術前・術後:4クール　手術不能・再発:PDまで)

ID: @PATIENTID　患者氏名: @PATIENTNAME　医師: @ACTIVEUSERNAME

年齢(歳): @PATIENTAGEYEAR　性別: @PATIENTSEXN

身長(cm): @REF_HEIGHT_01　体重(kg): @REF_WHEIG　体表面積(m^2):

クール数:　回目　投与開始日:

day 1

シリンジ①　**皮下注**	
フェスゴ配合皮下注IN(15mL)	1 V

8分
皮下注

ーーーーフェスゴ皮下注投与後30分観察してから以下を投与するーーーー

本体	側管

ボトル①

ボトル①　ルートキープ・フラッシュ用	
生理食塩水(50ml)	1 V

ボトル②

30分

ボトル②　点滴静注	
生理食塩水(50mL)	1 V
デカドロン(3.3mg/1mL)	2 A

ボトル③

60分

ボトル③　点滴静注	
5%ブドウ糖(250mL)	1 袋
ドセタキセル(80mg/4mL)	mg
ドセタキセル(20mg/1mL)	mg
【標準量　75 mg/m^2:	#### mg】

ボトル①

全開

ボトル①
ボトル①の生理食塩水でフラッシュ

day 2、3

デカドロン錠(4mg)　2錠　分2　朝・昼食後

【医師の指示】

【薬剤師のコメント】

★使用するケモセーフロック★
・ボトル③・・・バッグスパイク(ドセタキセルを輸液に混注後に装着する)

調製者	監査者