

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転 に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
1%ディプリバン注-キット	○	本剤の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事しないよう、患者に 注意すること。
d-クロルフェニラミン塩酸塩錠2mg「武田テバ」(ボラミン錠)	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の 運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意 すること。
MSコンチン錠10mg	○	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
PL配合顆粒	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運 転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意する こと。
SG配合顆粒	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることが あるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、機械の操作等、 機敏な動作を必要とする仕事になるべく従事させないように注意すること。
アーテン錠(2mg)	○	眠気、眼の調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
アーリーダ錠60mg		痙攣発作があらわれることがあるので、本剤投与中の 患者には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
アイファガン点眼液0.1%		眠気、めまい、霧視等を起こすことがあるので、本 剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機 械の操作に従事する場合は注意させること。
アイベータ配合点眼液		眠気、めまい、霧視等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事する場合は注意させること。
アイミクス配合錠LD/HD(イルアミクス配合錠LD/HD)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがある ので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
アイラミド配合懸濁性点眼液		眠気、めまい、霧視等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事する場合は注意させること。
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL・アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL	○(回復するまで)	本剤の硝子体内注射後、一時的に霧視等があらわれ ることがあるため、その症状が回復するまで機械類 の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。
アウィクリ注フレックスタッチ総量700単位		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車 の運転等に従事している患者に投与するときには注意す ること。
アキネトン錠1mg	○	眠気、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」		意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に 十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれやすいので、患者の状態によっては従事さ せないよう注意すること
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」(アジルバ錠)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
アジルバ錠20mg		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
アスペノンカプセル20	○	本剤の投与中に、手指振戦、めまい、ふらつき等の精 神神経系症状が発現し、増悪する傾向がある場合には、直ちに減量又は投与を中止すること(精神神経系の症状は用量依存的に発現しやすい)。また、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
アゾルガ配合懸濁性点眼液		本剤の点眼後、一時的に目がかすむことがあるので、機械類の操作や自動車等の運転には注意させること。
アダラートCR錠20mg／アダラートCR錠40mg		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
アタラックス-Pカプセル25mg	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作には従事させないよう注意すること。
アタラックス-Pシロップ0.5%	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作には従事させないよう注意すること。
アタラックス-P注射液(25mg/ml)	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作には従事させないよう注意すること。
アテノロール錠25mg「トーワ」		めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期)には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業に注意させること。
アテレック錠10		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
アトモキセチン錠5mg「DSEP」／アトモキセチン錠10mg「DSEP」／アトモキセチン錠25mg「DSEP」／アトモキセチン錠40mg「DSEP」(ストラテラカプセル)	○	眠気、めまい等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」(ストラテラ内用液)	○	眠気、めまい等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(1mL)	○	視調節障害、散瞳等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないなど注意すること。
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	○	視調節障害、散瞳等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないなど注意すること。
アナストロゾール錠1mg「DSEP」(アリミデックス錠)		本剤との関連性は明確ではないが、臨床試験において無力症や傾眠等が報告されているので、自動車の運転や機械の操作には注意すること。
アナフラニール錠10mg／アナフラニール錠25mg(クロミプラミン塩酸塩)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
アバレプト懸濁性点眼液0.3%		本剤の点眼後、一時的に目がかすむことがあるので、機械類の操作や自動車等の運転には注意させること。
アブストラル舌下錠100μg	○	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL	○(回復するまで)	本剤の硝子体内注射後、一時的に霧視等があらわれることがあるため、その症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないように注意すること。
アポハイドローション20%		抗コリン作用により、目の調節障害(視力障害、霧視等)、めまい、眠気等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(シンメトレル錠)	○	めまい、ふらつき、立ちくらみ、霧視等があらわれることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」／アムロジピンOD錠5mg「明治」(アムロジンOD錠)		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
アムロジン錠5mg		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
アリセプトD錠10mg	○	アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症では、自動車の運転等の機械操作能力が低下する可能性がある。また、本剤により、意識障害、めまい、眠気等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう患者等に十分に説明すること。
アリドネパッチ27.5mg/55mg	○	アルツハイマー型認知症では、自動車の運転等の機械操作能力が低下する可能性がある。また、本剤により、意識障害、めまい、眠気等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう患者等に十分に説明すること。
アリピプラゾール錠3mg/6mg7「サワイ」(エビリファイ錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
アルダクトンA錠25mg/A細粒10%		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
アルプラゾラム0.4mg錠「トーワ」(ソラナックス錠・コンスタン錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
アレビアチン散10%	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
アレビアチン注250mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
アレロック錠5mg/顆粒0.5%	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」(アルマール錠)		めまい・ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期)には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業に注意させること。
アロフト錠20mg	○	反射運動能力の低下、眠気等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
アンペック坐剤20mg	○	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
イーケブラ錠500mg	○(条件付き)	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがある。自動車の運転等危険を伴う機械操作の適否は、関連学会の留意事項1)を十分理解の上、医師が慎重に判断し、危険を伴う機械操作を行う場合には十分な注意が必要であることを適切に患者に指導すること。また、眠気等があらわれた場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、患者に指導すること。
イーシー・ドパール配合錠	○	前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
イクスタンジ錠40mg		痙攣発作があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
イマチニブ錠「DSEP」100mg(グリベック錠)		めまい、眠気、霧視等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転 に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
イミグランキット皮下注3mg	○	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないように十分注意すること。
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」(ウルトスOD錠)		眼調節障害(羞明、霧視、眼の異常感等)、めまい、眠気があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に注意させること。
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(タナトリル錠)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
イルアミクス配合錠LD/HD(アイミクス配合錠LD/HD)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
イルトラ配合錠LD		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」		低血糖を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
インチュニブ錠3mg	○	眠気、鎮静等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
インデラル錠10mg		めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期)には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業に注意させること。
インデラル注射液2mg		めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期)には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業に注意させること。
ウインタミン細粒10%(クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ウブトラビ錠0.2mg		意識障害等があらわれることがあるので自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう、等患者に十分に説明すること。
エキセメスタン錠25mg「NIG」(アロマシン錠)	○	本剤の使用による嗜眠、傾眠、無力(症)及びめまいが報告されており、このような症状がある場合、機械操作や自動車の運転はさせないように十分注意すること。
エクセグラン錠100mg/エクセグラン散20%	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
エクフィナ錠50mg(成分:サフィナミド)	○	本剤投与により日中の傾眠、前兆のない突発的睡眠があらわれることがあるため、本剤投与中の患者には自動車の運転、機械の操作、高所での作業等、危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
エクメット配合錠LD/HD(メホビル配合錠LD/HD)		低血糖及び低血糖症状を起こすおそれがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
エスシタロプラム錠10mg「明治」(レクサプロ錠)		眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。
エスゾピクロン錠1mg「明治」(ルネスタ錠)	○	本剤の影響が翌朝以降に及び、眠気、注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
エスタゾラム錠2mg「アメル」(ユーロジン錠)	○	本剤の投与により、その影響が翌朝以後に及ぶことがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
エチゾラム錠0.5mg「トーフ」(デパス錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
エックスフォージ配合錠		降圧作用に基づくめまい、ふらつき等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」/エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(レニベース錠)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
エビナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」(アレジオン錠)		眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意させること。
エフピーOD錠2.5	○	めまい、注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
エブランチルカプセル15mg		本剤の投与初期又は用量の急増時等に、起立性低血圧に基づく立ちくらみ、めまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する人には注意を与えること。
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」(ミオナール錠)	○	本剤投与中に脱力感、ふらつき、眠気等が発現することがあるので、その場合には減量又は休薬すること。なお、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
エンタカポン錠100mg「サンド」(コムタン錠)	○	前兆のない突発的睡眠、傾眠、起立性低血圧があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、高所での作業等、危険を伴う作業には従事させないように注意すること。
エンレスト錠100mg/200mg		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
オイグルコン錠2.5mg		重篤かつ遷延性の低血糖を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
オキシコンチンTR錠5mg/オキシコンチンTR錠10mg/オキシコンチンTR錠20mg/オキシコンチンTR錠40mg	○	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転 に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
オキノーム散2.5mg/オキノーム散5mg	○	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
オゼンピック皮下注2mg		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
オプソ内服液5mg/オプソ内服液10mg	○	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
オランザピンOD錠「アメル」 2.5mg/5mg/10mg(ジプレキサザイデイス錠)	○	傾眠、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には高所での作業あるいは自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(オルメテック錠)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」(アレロック錠)	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。
カデチア配合錠HD「テバ」(エカードHD錠)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ガバペン錠200mg/ガバペン錠400mg	○	傾眠、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
カプトプリル錠25mg「JG」		血圧低下に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者で高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に注意させること。
カムシア配合錠HD「あすか」		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」/ガランタミンOD錠8mg「DSEP」(レミニール錠)		アルツハイマー型認知症患者では運転能力や機械操作能力が徐々に低下し、また、本剤の投与によりめまい、眠気が起こる可能性があるため、本剤投与中の患者(特に投与開始の数週間)には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意するよう指導すること。
カルピスケン錠5mg		めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期)には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業に注意させること。
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」/カルベジロール錠10mg「サワイ」(アーチスト錠)	○	めまい・ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期や増量時)には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業をしないよう注意させること。
カンデサルタン錠2mg「あすか」/カンデサルタン錠8mg「あすか」(プロプレス錠)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
クービビック錠25mg/50mg	○	本剤の影響が服用の翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
クエチアピン錠25mg「明治」(セロクエル錠)	○	本剤は主として中枢神経系に作用するため、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
グラアルファ配合点眼液		眠気、めまい、霧視等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事する場合は注意させること。
グランダキシン錠50	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
グリミクロン錠40mg		重篤かつ遷延性の低血糖を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
グリメピリドOD錠1mg「YD」(アマリール錠)		重篤かつ遷延性の低血糖を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。また、低血糖に関する注意について、患者及びその家族に十分徹底させること。
グルカゴンGノボ注射用1mg		本剤投与後に二次的な低血糖が起こることがある。低血糖に基づくめまい、ふらつき、意識障害を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
グルベス配合錠		本剤は、ときに低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(リーゼ錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」(イレッサ錠)		臨床試験において無力症が報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意するよう指導すること。
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」/ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(ジェムザール点滴静注)	○(傾眠症状が発現しないことが確認されるまで)	本剤投与時に傾眠が認められることがあるので、このような症状が発現しないことが確認されるまで、自動車の運転等は行わないよう注意すること。
ケレンディア錠		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」	○	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転 に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
コララン錠2.5mg	○	光視症、霧視、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作をする際には患者に十分注意させること。また、これらの症状が認められた場合は、自動車の運転等危険を伴う操作に従事しないよう指導すること。
コンサータ錠18mg/コンサータ錠27mg /コンサータ錠36mg	○	めまい、眠気、視覚障害等が発現するおそれがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
コンスタン0.4mg錠(アルプラザラム錠 「トーフ」0.4mg)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
コントミン筋注25mg(クロルプロマジン塩 酸塩)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
コントミン糖衣錠25mg(クロルプロマジン 塩酸塩)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ザイザルシロップ0.05%	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。
サイプレジン1%点眼液	○(回復する まで)	本剤の点眼後、散瞳又は調節麻痺が起こるので、その症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。また、サングラスを着用する等太陽光や強い光を直接見ないよう指導すること。
サイレース錠1mg	○	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ザジテン点鼻液0.05%	○	眠気を催すことがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。
サムタス点滴静注用8mg		めまい等があらわれることがあるので、転倒に注意すること。また、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
サラジェン錠5mg		縮瞳を起こすおそれがあるので、投与中の患者には夜間の自動車の運転及び暗所での危険を伴う機械の操作に注意させること。
サリグレンカプセル30mg		縮瞳を起こすおそれがあるので、投与中の患者には夜間の自動車の運転及び暗所での危険を伴う機械の操作に注意させること。
ザルティア錠5mg		臨床試験において、めまいや視覚障害が認められているので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
サンドールP点眼液	○(回復する まで)	散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。また、サングラスを着用する等太陽光や強い光を直接見ないよう指導すること。
サンピロ点眼液2%	○(回復する まで)	本剤の点眼後、縮瞳(暗黒感)又は調節痙攣が起こるので、その症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。
ジアゼパム錠「サワイ」/ジアゼパム注10 mg「NIG」	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ジクトルテープ75mg	○	本剤使用中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
シクレスト舌下錠5mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼ リア」/ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「ゼリア」/ジクロフェナクナトリウム 坐剤50mg「ゼリア」	○	本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
ジスロマック錠250mg		意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トー ワ」(リスモダンカプセル)		めまい、低血糖等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
シベノール錠100mg	○	めまい、ふらつき、低血糖があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ジャディアンス錠10mg/25mg		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときは注意すること。
ジャドニユ顆粒分包360mg		本剤投与中にめまい、視覚・聴力障害があらわれることがあるので、患者に注意喚起し、本剤投与中は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意させること。
ジャヌビア錠50mg		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg 「サワイ」(ヘルベッサRカプセル)		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ジルテック錠10	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。
シロドシンOD錠4mg「DSEP」(ユリーフ 錠)		めまいなどがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転など危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
シンメトレル細粒10%	○	めまい、ふらつき、立ちくらみ、霧視等があらわれることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
スーグラ錠50mg		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
スープレイン吸入麻酔液	○	麻酔の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
スタレボ配合錠L100	○	前兆のない突発的睡眠、傾眠、起立性低血圧等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、高所での作業等、危険を伴う作業には従事させないように注意すること。
ストロメクトール錠3mg		意識障害があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
スピロラクソン錠25mg「トーフ」(アルダクトンA錠)		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
スルピリド錠50mg「NIG」(ドグマチール錠)	○	ときに眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
セディール錠10mg	○	眠気・めまい等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
セバゾン錠1／セバゾン散1%	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
セララ錠50mg		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
セリンクロ錠10mg		注意力障害、浮動性めまい、傾眠等が起こることがあるので、本剤を服用している患者には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
セルトラリン錠50mg「明治」(ジェイゾロフト錠)		眠気、めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。
セレコキシブ錠100mg「明治」(セレコックス錠)		浮動性めまい、回転性めまい、傾眠等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
セレコックス錠100mg		浮動性めまい、回転性めまい、傾眠等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
セレストミン配合錠	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
セレニカR顆粒40%／セレニカR錠200mg	○(適応により違いあり)	〈各種てんかんおよびてんかんに伴う性格行動障害の治療〉 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがある。自動車の運転等危険を伴う機械操作の適否は、関連学会の留意事項3)を十分理解の上、医師が慎重に判断し、危険を伴う機械操作を行う場合には十分な注意が必要であることを適切に患者に指導すること。また、眠気等があらわれた場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、患者に指導すること。 〈躁病および躁うつ病の躁状態の治療、片頭痛発作の発症抑制〉 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
セレネース細粒1%(ハロペリドール)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
セレネース注5mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
セレネース内服液0.2%	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
セロクエル細粒50%	○	本剤は主として中枢神経系に作用するため、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ソセゴン錠25mg	○	眠気、めまい、ふらつき等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
ソセゴン注射液15mg	○	眠気、めまい、ふらつき等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
ゾニサミドOD錠TRE25mg(トレリーフOD錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」(アモバン錠)	○	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
ソリクア配合注ソロスター		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」(ベシケアOD錠)		眼調節障害(霧視等)、傾眠が起こることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」(マイスリー錠)	○	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーフ」(ゾーミック錠)	○	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないよう十分注意すること。
ゾレア皮下注150mgシリンジ1mL		本剤投与中にめまい、疲労、失神、傾眠があらわれることがあるため、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事する場合には十分に注意させること。
ダイアモックス錠250mg		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」(ザルティア錠)		臨床試験において、めまいや視覚障害が認められているので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ダバグリフロジン錠5mg/10mg(フォシーガ錠)		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときは注意すること。
タブロスミニ点眼液0.0015%	○(回復するまで)	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、その症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」(ハルナールD錠)		めまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
タリージェ錠5mg/タリージェ錠10mg	○	めまい、傾眠、意識消失等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
タリオン錠10mg	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ダントリウムカプセル25mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
チアブリド錠50mg「サワイ」/チアブリド細粒10%「サワイ」(グラマリール錠・細粒)	○	眠気、めまい・ふらつき等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
チャンピックス錠0.5mg/チャンピックス錠1mg	○	めまい、傾眠、意識障害等があらわれ、自動車事故に至った例も報告されているので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
ツイミグ錠		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
ツートラム錠25mg/50mg	○	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
デエビゴ錠2.5mg/5mg	○	本剤の影響が服用の翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「トーフ」(メジコン錠)	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(プレセデックス静注)	○	[局所麻酔下における非挿管での手術及び処置時の鎮静]全身状態に注意し、手術・処置後は患者が回復するまで管理下に置くこと。なお、鎮静の影響が完全に消失するまでは自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事しないよう、患者に注意すること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
テグレトール錠100mg／テグレトール錠200mg／テグレトール細粒50%	○(適応により違いあり)	〈精神運動発作、てんかん性格及びてんかんに伴う精神障害、てんかんの痙攣発作：強直間代発作(全般痙攣発作、大発作)〉 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがある。自動車の運転等危険を伴う機械操作の適否は、関連学会の留意事項3)を十分理解の上、医師が慎重に判断し、危険を伴う機械操作を行う場合には十分な注意が必要であることを適切に患者に指導すること。また、眠気等があらわれた場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、患者に指導すること。 〈躁病、躁うつ病の躁状態、統合失調症の興奮状態及び三叉神経痛〉 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること
テシプール錠1mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
テネリアOD錠20mg		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
デパケン錠200mg	○(適応により違いあり)	〈各種てんかんおよびてんかんに伴う性格行動障害の治療〉 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがある。自動車の運転等危険を伴う機械操作の適否は、関連学会の留意事項3)を十分理解の上、医師が慎重に判断し、危険を伴う機械操作を行う場合には十分な注意が必要であることを適切に患者に指導すること。また、眠気等があらわれた場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、患者に指導すること。 〈躁病および躁うつ病の躁状態の治療、片頭痛発作の発症抑制〉 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること
デュオトラバ配合点眼液	○(回復するまで)	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。
デュロキセチンOD錠20mg/30mg(サインバルタカプセル)		眠気、めまい等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。また、患者に、これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、指導すること。
デュロテップMTパッチ		眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
テラムロ配合錠AP「DSEP」		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		一過性の血圧低下に基づくめまいや立ちくらみ、意識消失等があらわれることがあるので、高所での作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
テリボン皮下注用56.5μg		一過性の血圧低下に基づくめまいや立ちくらみ、意識消失等があらわれることがあるので、高所での作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
テルネリン錠1mg	○	反射運動能力の低下、眠気、めまい及び低血圧等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。
テルミサルタン錠40mg「DSEP」(ミカルディス錠)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
トラアセット配合錠「DSEP」(トラムセット配合錠)	○	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
ドキサゾシン錠2mg「YD」(カルデナリン錠)		本剤の投与初期又は用量の急増時等に起立性低血圧に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg/5mg「明治」(アリセプトOD錠)	○	アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症では、自動車の運転等の機械操作能力が低下する可能性がある。また、本剤により、意識障害、めまい、眠気等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう患者等に十分に説明すること。
ドパコール配合錠L100	○	前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
ドバストンカプセル250mg	○	前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
ドバストン静注50mg	○	前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
トピエース錠4mg		眼調節障害(霧視等)、めまい、眠気等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転 に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
トフラニール錠10mg(イミプラミン塩酸塩)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
トラセミドOD錠8mg「TE」(ルプラック錠)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
トラゼンタ錠5mg		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
トラゾドン塩酸塩錠「アメル」25mg/50mg(デジレル錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
トラディアンス配合錠AP/BP		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときは注意すること。
トラバタンズ点眼液0.004%	○(回復するまで)	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。
トラベルミン配合錠	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
トラマドールOD錠25mg「KO」(トラマールOD錠25mg)	○	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
トランコロンP配合錠	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下、視調節障害が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
トリクロリールシロップ10%	○	本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
トリプタノール錠10	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
トルバプタンOD錠7.5mg/15mg「オーツカ」 トルバプタンOD錠3.75mg「TE」(サムスカOD錠)		めまい等があらわれることがあるので、転倒に注意すること。また、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
トルリシティ皮下注0.75mg/1.5mgアテオス		低血糖があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときは注意すること。
トレシーバ注フレックスタッチ		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
トレドミン錠15mg		眠気、めまい等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。また、患者に、これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、指導すること。
トロピカミド点眼液0.4%「日点」	○(回復するまで)	散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。また、サングラスを着用する等太陽光や強い光を直接見ないように指導すること。
ドンベリドン錠10mg「サワイ」(ナウゼリン錠)		眠気、めまい・ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に注意させること。
ナウゼリンドライシロップ1%		眠気、めまい・ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に注意させること。
ナウゼリン坐剤10/ナウゼリン坐剤30/ナウゼリン坐剤60		眠気、めまい・ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に注意させること。
ナトリックス錠1		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ナフトピジルOD錠75mg「YD」(フリバスOD錠)		本剤の投与初期又は用量の急増時等に、起立性低血圧に基づくめまい、立ちくらみ等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する人には注意を与えること。
ナルサス錠	○	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
ナルラピド錠	○	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
ニトラゼパム錠5mg(ベンザリン錠)	○	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ニトロールRカプセル20mg	○	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は中止するなど適切な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ニトロダームTTS25mg	○	本剤使用開始時には他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は使用を中止するなど適切な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力・集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
ニトロペン舌下錠0.3mg	○	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用が起こりやすく、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
ニバジール錠2mg		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ニフェジピンL錠10mg「日医工」(アダラートL錠)		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(アダラートカプセル)		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ニュープロ パッチ2.25mg/4.5mg/9mg/18mg	警告 ○	(警告) 前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤貼付中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。 (使用上の注意) 本剤を含めたドパミン受容体作動薬の投与により突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されている。突発的睡眠を起こした症例の中には、傾眠や過度の眠気のような前兆を認めなかった例あるいは投与開始後1年以上経過した後に初めて発現した例も報告されている。患者には本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
ニューレプチル錠5mg/ニューレプチル錠25mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ニューロタン錠25mg		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ネオシネジンコーワ5%点眼液	○(回復するまで)	本剤を投与した患者には散瞳が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。また、サングラスを着用するなど太陽光や強い光を直接見ないように注意すること。
ネルボン錠10mg/ネルボン散1%	○	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ノーベルバル静注用250mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ノックピン原末	○	眠気、注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ノバミン錠5mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ノボラピッド注フレックスペン(インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」)		低血糖を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
ノリレン錠10mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ノルスパンテープ5mg/ノルスパンテープ10mg	○	眠気、めまい、ふらつき等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
バイアグラ錠2.5mg/5mg		臨床試験において、めまいや視覚障害が認められているので、自動車の運転や機械の操作に従事する場合には注意させること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
パキシルCR錠12.5mg		眠気、めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。これらの症状は治療開始早期に多くみられている。
バクスマー一点鼻粉末剤3mg		本剤投与で意識レベルが一時回復しても、低血糖の再発や遷延により、めまい、ふらつき、意識障害を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
パクリタキセル注射液30mg/100mg「サワイ」(タキソール注射液)	○	本剤は無水エタノールを含有するため、前投薬で投与される ジフェンヒドラミン塩酸塩錠とアルコールの相互作用による 中枢神経抑制作用の増強の可能性があるため、本剤投与後の 患者の経過を観察し、アルコール等の影響が疑われる場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
バビースモ硝子体内注射用キット120mg	○(回復するまで)	本剤の硝子体内注射後、一時的に視覚障害があらわれることがあるため、視機能が十分に回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。
バラシクロビル錠500mg「SPKK」(バルトレックス錠)		意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれやすいので、患者の状態によっては従事させないよう注意すること。
バラシクロビル顆粒50%「SPKK」(バルトレックス顆粒)		意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれやすいので、患者の状態によっては従事させないよう注意すること。
バルサルタン錠80mg「Me」(ディオバン錠)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ハルシオン 0.25mg錠	○	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」(デバケンシロップ)	○(適応により違いあり)	〈各種てんかんおよびてんかんに伴う性格行動障害の治療〉 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがある。自動車の運転等危険を伴う機械操作の適否は、関連学会の留意事項3)を十分理解の上、医師が慎重に判断し、危険を伴う機械操作を行う場合には十分な注意が必要であることを適切に患者に指導すること。また、眠気等があらわれた場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、患者に指導すること。 〈躁病および躁うつ病の躁状態の治療、片頭痛発作の発症抑制〉 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」/バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」(デバケンR錠)	○(適応により違いあり)	〈各種てんかんおよびてんかんに伴う性格行動障害の治療〉 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがある。自動車の運転等危険を伴う機械操作の適否は、関連学会の留意事項3)を十分理解の上、医師が慎重に判断し、危険を伴う機械操作を行う場合には十分な注意が必要であることを適切に患者に指導すること。また、眠気等があらわれた場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、患者に指導すること。 〈躁病および躁うつ病の躁状態の治療、片頭痛発作の発症抑制〉 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
パロキセチン錠5mg「明治」/パロキセチン錠10mg「明治」/パロキセチン錠20mg「明治」(パキシル錠)		眠気、めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。これらの症状は治療開始早期に多くみられている。
ハロペリドール錠0.75mg/細粒1% (セレーネース錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
ビ・シフロール錠0.5mg	警告 ○	(警告)前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。 (使用上の注意)突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されている。突発的睡眠を起こした症例の中には、傾眠や過度の眠気のような前兆を認めなかった例あるいは投与開始後1年以上経過した後に初めて発現した例も報告されている。患者には本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」(アクトス錠)		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
ビクトーザ皮下注18mg		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
ビソノテープ4mg/8mg		めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期)には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ビソプロロール錠0.625mg/2.5mg「サワイ」(メインテート錠)		めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期)には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ヒドロキシクロロキン塩酸塩錠200mg「DSEP」(プラケニル錠)		視調節障害、霧視等の視覚異常や低血糖症状があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作や高所での作業等には注意させること。
ヒベルナ注25mg	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
ビムパット錠50mg/100mg(ラコサミド錠)	○(条件付き)	浮動性めまい、霧視、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがある。自動車の運転等危険を伴う機械操作の適否は、関連学会の留意事項1)を十分理解の上、医師が慎重に判断し、危険を伴う機械操作を行う場合には十分な注意が必要であることを適切に患者に指導すること。また、眠気等があらわれた場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、患者に指導すること。
ヒューマログミックス50注ミリオペン		低血糖があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときは注意すること。
ヒューマログ注ミリオペン		低血糖があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときは注意すること。
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg/50mg「DSEP」(サンリズムカプセル)		めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
ビルトリシド錠600mg		眠気があらわれることがあるので、自動車の運転、機械の操作等危険を伴う作業に注意させること。
ファムビル錠250mg		意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
フィアスプ注フレックスタッチ		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
フィコンパ錠2mg	○	めまい、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う操作に従事させないように注意すること。
ブイフェンド200mg静注用	警告 ○	羞明、霧視、視覚障害等の症状があらわれ、本剤投与中止後も症状が持続することがある。本剤投与中及び投与中止後もこれらの症状が回復するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
ブイフェンド錠200mg	警告 ○	羞明、霧視、視覚障害等の症状があらわれ、本剤投与中止後も症状が持続することがある。本剤投与中及び投与中止後もこれらの症状が回復するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
フェノバルール散10%/フェノバルール錠30mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
フェノバルール注射液100mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」/フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」/フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」/フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	○	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	○	本剤の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
フェントステープ1mg/フェントステープ2mg/フェントステープ4mg/フェントステープ8mg	○	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
フォシーガ錠5mg/10mg(ダバグリフロジン)		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときは注意すること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
ブスコパン錠10mg	○	眼の調節障害等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ブスコパン注20mg	○	眼の調節障害、眠気、めまい等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
プリンゾラミド懸濁性点眼液(エイゾプト懸濁性点眼液)		本剤の点眼後、一時的に目がかすむことがあるので、機械 類の操作や自動車等の運転には注意させること。
プリンペランシロップ0.1%	○	眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
フルイトラン錠2mg		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(ロヒプノール錠)	○	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転 等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「YD」(ルボックス錠)	○	眠気、意識レベルの低下・意識消失等の意識障害が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」5mL(アネキセート注射液)	○	本剤投与後24時間は危険な機械の操作や自動車の 運転等完全な精神的緊張を必要とする仕事に従事させないように注意すること。
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」/ プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」(リリカ)	○	本剤の投与によりめまい、傾眠、意識消失等があらわれ、自動車事故に至った例もあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。特に高齢者ではこれらの症状により転倒し骨折等を起こした例があるため、十分に注意すること。
プレミント配合錠LD/HD(ロサルヒドLD/HD)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
プロ・バンサイン錠15mg	○	眼の調節障害、眠気を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意 すること。
フロセミド注20mg「トーワ」		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作 する際には注意させること。
フロセミド錠40mg「トーワ」/フロセミド錠20mg「NIG」/フロセミド細粒4%「EMEC」(ランックス)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(レンドルミンOD錠)	○	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
プロナンセリン錠2mg「DSPB」(ロナセン錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
プロノン錠150mg		めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」(バップフォー錠)	○	眼調節障害、眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう十分に注意すること。
プロブレス錠2/プロブレス錠8		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
プロポフォル静注1%20mL/プロポフォル静注1%50mL「マルイシ」	○	本剤の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事しないよう、患者に注意すること。
プロマゼパム錠2mg「サンド」(レキソタン錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を 伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	○	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には 自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注 意すること。
ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」/ ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」(コニール錠)		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ベプリコール錠50mg		めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
ペラプロストNa錠20μg「サワイ」(ドルナー錠)		意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
ペリアクチンシロップ0.04%	○	眠気を催すことがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分に注意すること。
ペリアクチン散1%	○	眠気を催すことがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分に注意すること。
ベリキューボ錠2.5mg/10mg		めまいがあらわれることがあるので、高所作業、自動車 の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」(コバシル錠)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ベルケイド注射用3mg	○	疲労、浮動性めまい、失神、起立性低血圧、霧視が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
ヘルベッサ錠30		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(ルーラン錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ベンザリン細粒1%	○	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ボグリボースOD錠0.2mg/0.3mg「武田テバ」(ベイスン錠)		本剤は低血糖症状を起こすことがあるので、糖尿病患者又は耐糖能異常を有する者に対し低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。また、高所作業、自動車の運転等に従事している糖尿病患者又は耐糖能異常を有する者に投与するときには注意すること。
ホストイン静注750mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ボトックス注用50単位		本剤投与後、脱力感、筋力低下、めまい、視力低下があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ボラミン散1%	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
ボラミン注5mg	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
ボルタレン錠25mg	○	本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
マイスタン錠10mg/マイスタン細粒1%(クロバザム)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
マイスリー錠5mg(ゾルピデム錠)	○	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
マキュエイド眼注用40mg	○(回復するまで)	本剤投与後、霧視、飛蚊症等があらわれることがあるため、その症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないように注意すること。また、国内臨床試験では投与後3ヵ月時点で約半数の患者の眼内に本剤の残存が認められているので、本剤の消失が認められるまで定期的に観察すること。
マドパー配合錠	○	前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
マリゼブ錠25mg		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
マンジャロ皮下注アテオス2.5mg/5mg/7.5mg/10mg/12.5mg/25mg		低血糖を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
ミオコールスプレー0.3mg	○	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用が起こりやすく、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ミオナール錠50mg	○	本剤投与中に脱力感、ふらつき、眠気等が発現することがあるので、その場合には減量又は休薬すること。なお、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
ミグシス錠5mg	○	眠気等を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
ミグリトールOD錠50mg「トローワ」(セイブル錠)		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
ミダゾラム注10mg「サンド」(ドルミカム注)	○	手術・処置後は全身状態に注意し、基本的運動・平衡機能の回復等に基づき帰宅可能と判断できるまで患者を管理下に置くこと。また、鎮静の影響が完全に消失するまでは自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事しないよう、患者に注意すること。
ミネプロOD錠2.5mg		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(ミノマイシン)	○	めまい感があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作及び高所での作業等に従事させないように注意すること。
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	○	めまい感があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作及び高所での作業等に従事させないように注意すること。
ミノマイシン顆粒2%	○	めまい感があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作及び高所での作業等に従事させないように注意すること。
ミルタザピン錠15mg「明治」(リフレックス錠)	○	眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ムコスタ点眼液UD2%		本剤の点眼後、一時的に目がかすむことがあるので、機械類の操作や自動車等の運転には注意させること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
メイラックス錠1mg/2mg(ロフラゼブ酸エチル)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トローワ」/メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トローワ」(メキシチールカプセル)	○	頭がボーとする、めまい、しびれ等の精神神経系症状が発現し、増悪する傾向がある場合には、直ちに減量又は投与を中止すること。また、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
メキタジン錠3mg「サワイ」(ニポラジン錠)	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作には従事させないように十分注意すること。
メタクト配合錠HD		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
メグルコ錠250mg		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
メクロブラミド細粒2%「ツルハラ」/メクロブラミド錠5mg「トローワ」(プリンペラン)	○	眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
メクロブラミド注射液10mg「NIG」(プリンペラン注)	○	眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
メネシット配合錠	○	前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
メホビル配合錠LD/HD「トローワ」(エクメット配合錠LD/HD)		低血糖及び低血糖症状を起こすおそれがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」/メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(メマリ-OD錠)	○	通常、中等度及び高度アルツハイマー型認知症では、自動車の運転等危険を伴う機械の操作能力が低下することがある。また、本剤により、めまい、傾眠等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
モービック錠10mg	○	眼の調節障害、眠気等の精神神経系症状があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」	○	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
ラコサミド錠50mg/100mg/DS10%「サワイ」(ビムバット錠)	○(条件付き)	浮動性めまい、霧視、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがある。自動車の運転等危険を伴う機械操作の適否は、関連学会の留意事項1)を十分理解の上、医師が慎重に判断し、危険を伴う機械操作を行う場合には十分な注意が必要であることを適切に患者に指導すること。また、眠気等があらわれた場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、患者に指導すること。
ラタチモ配合点眼液「センジュ」	○(回復するまで)	(7)本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないように注意すること。
ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」(キサラン点眼液)	○(回復するまで)	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないように注意すること。
ラミシール錠125mg		眠気、めまい・ふらつき等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(ロゼレム錠)	○	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ラモトリギン錠25mg/100mg「サワイ」(ラミクタール錠)	○(適応により違いあり)	〈各種てんかんの治療〉 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがある。自動車の運転等危険を伴う機械操作の適否は、関連学会の留意事項1)を十分理解の上、医師が慎重に判断し、危険を伴う機械操作を行う場合には十分な注意が必要であることを適切に患者に指導すること。また、眠気等があらわれた場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、患者に指導すること。 〈双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制〉 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ランタスXR注シロスター		低血糖を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
ランデル錠20		降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転に從事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
ランドセン錠0.5mg/1mg/細粒1%	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
リーマス錠100	○	めまい、ねむけ等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作に従事させないように注意すること。
リオレサル錠5mg	○	眠気等を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
リザトリプタンOD錠10mg「TCK」(マクサルトPRD錠)	○	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないように十分注意すること。
リスパダールOD錠1mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
リスベリドンOD錠1mg「アメル」(リスパダール錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
リスベリドン内用液分包1mg「アメル」	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
リスミー錠1mg	○	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
リタリン錠10mg	○	めまい、眠気、視覚障害等が発現するおそれがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」/リバスチグミンテープ9mg「YP」/リバスチグミンテープ18mg「YP」(リバスタッチパッチ)	○	アルツハイマー型認知症は、自動車の運転等の機械操作能力を低下させる可能性がある。また、本剤は主に投与開始時又は増量時にめまい及び傾眠を誘発することがある。このため、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
リベルサス錠3mg/7mg/14mg		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときは注意すること。
リボトリール錠0.5mg(クロナゼパム)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
リルゾール錠50mg「AA」(リルテック錠)	○	本剤の投与中に、めまい又は眠気が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
ルボックス錠25	○	眠気、意識レベルの低下・意識消失等の意識障害が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ルミガン点眼液0.03%	○(回復するまで)	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないように指導すること。
ルムジェブ注ミリオペンHD		低血糖があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときは注意すること。
レキサルティOD錠1mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
レキップ錠1mg	警告 ○	(警告)前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。 (使用上の注意)突発的睡眠により自動車事故を起こした例が報告されていることから、患者には突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。なお、海外において突発的睡眠を起こした症例の中には、傾眠や過度の眠気のような前兆を認めなかった例あるいは投与開始後1年以上経過した後初めて発現した例も報告されている。
レグナイト錠300mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
レザルタス配合錠HD		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
レスタミンコーワ錠10mg	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
レスミット錠2	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
レトロゾール錠2.5mg「サンド」(フェマール錠)		疲労、めまい、まれに傾眠が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
レニベース錠2.5mg/5mg		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」(シュアポスト錠)		低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
レバチオ錠20mg		めまいや視覚障害、色視症、霧視等が認められているので、自動車の運転や機械の操作に従事する場合には注意させること。
レベタン坐剤0.4mg	○	眠気、めまい、ふらつき、注意力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に、従事させないように注意すること。
レベタン注0.2mg	○	眠気、めまい、ふらつき、注意力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に、従事させないように注意すること。
レベチラセタム錠250mg/ドライシロップ50%(イーケブラ)	○(条件付き)	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがある。自動車の運転等危険を伴う機械操作の適否は、関連学会の留意事項1)を十分理解の上、医師が慎重に判断し、危険を伴う機械操作を行う場合には十分な注意が必要であることを適切に患者に指導すること。また、眠気等があらわれた場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、患者に指導すること。
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「明治」/レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「タカタ」(ザイザル)	○	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
レボトミン錠5mg/レボトミン錠25mg	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
レボフロキサシン錠250mg/500mg「DSEP」(クラビット錠)		意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」(クラビット点滴静注)		意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(アルチバ静注用)	○	麻酔の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転や危険を伴う機械の操作等に従事しないよう、患者に注意すること。
レンビマカプセル4mg		疲労、無力症、めまい、筋痙攣等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
ローガン錠10mg		めまい・立ちくらみ等があらわれることがあるので高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械の作業に注意させること。
ロートエキス散<ハチ>		視調節障害、散瞳、羞明、めまい等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意させること。
ロサルヒドLD/HD「日医工」(プレミント配合錠LD/HD)		降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
ロピニロール徐放錠2mg/8mg(レッキプCR)	警告 ○	(警告)前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。 (使用上の注意)突発的睡眠により自動車事故を起こした例が報告されていることから、患者には突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。なお、海外において突発的睡眠を起こした症例の中には、傾眠や過度の眠気のような前兆を認めなかった例あるいは投与開始後1年以上経過した後初めて発現した例も報告されている。
ロフラゼプ酸エチル錠(メイラックス錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

自動車運転に注意が必要な薬剤リスト

2026年6月作成

当院採用薬を中心に作成(主な先発医薬品名記載)

重要な基本的注意に記載のあるもの

販売名	自動車運転に従事させない指導	添付文書(重要な基本的注意)
ロペミンカプセル1mg/小児用細粒0.05%	○	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(ロペミンカプセル)	○	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(ワイパックス錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ワイパックス錠0.5(ロラゼパム錠)	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
ワントラム錠100mg	○	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
一硝酸イソソルビド錠20mg「トロー」(アイトロール錠)	○	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は投与中止するなど適切な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
臭化カリウム「ヤマゼン」	○	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」(フランドルテープ)	○	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は投与中止するなど適切な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
日点アトロピン点眼液1%	○(回復するまで)	散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。また、サングラスを着用する等太陽光や強い光を直接見ないように指導すること。