


# 新型コロナウイルスワクチン接種（1～3回目）について

～新たに武田社のワクチン（ノバボックス）で接種を受けられるようになります～

武田社の新型コロナウイルスワクチン（ノバボックス）が薬事承認されました。18歳以上の1・2回目接種、3回目接種に使用することが可能になり、従来のm-RNAワクチンであるファイザーワクチン、武田/モデルナワクチンに加えてワクチンの種類に選択肢が増えました。初回接種でm-RNAワクチンを接種し、強い副反応が出たため2・3回目接種をためらっていらっしゃる方などを対象に、市内でノバボックスの接種を行います。



## ノバボックスワクチンの特徴

- 新たに国内で承認された4例目のワクチン
- 武田薬品工業株式会社が米国ノバボックス社から技術移管を受けて、国内で製造
- 「組換えタンパクワクチン」という種類で、不活化ワクチンの一種※



### 有効性

※B型肝炎ウイルスワクチンなど他のワクチンでも使用実績があります

（1・2回目接種）約90%の発症予防効果 オミクロン株に対しても、接種により中和抗体価が上昇したとの報告があります。  
（3回目接種）3回目接種から28日後の中和抗体価は、2回目接種から14日後の中和抗体価より4倍高く、一定の有効性が期待できます。

### 副反応

頭痛、関節や筋肉の痛み、注射した部分の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります（副反応には個人差があります）。

### 接種後7日間に現れた症状

報告割合	1回目接種後	2回目接種後	3回目接種後			
50%以上		圧痛 65.2%	圧痛 81.4% 疼痛 54.6%	疲労 63.3% 筋肉痛 51.0%		
10～50%	圧痛 48.2% 疲労 23.1% 筋肉痛 20.0%	疼痛 26.9% 頭痛 21.6% 倦怠感 12.2%	疼痛 45.6% 筋肉痛 30.8% 倦怠感 26.4%	疲労 35.6% 頭痛 29.6% 関節痛 14.8%	倦怠感 46.9% 頭痛 45.9% 関節痛 28.6% 悪心・嘔吐 13.3% 腫脹・硬結 11.3%	発熱 17.3% 紅斑 10.3%
1～10%	関節痛 6.7% 発熱 2.4%	悪心・嘔吐 5.9%	悪心・嘔吐 7.2% 紅斑 4.8%	腫脹 5.6% 発熱 4.4%		

（注）対象：1回目接種後253人、2回目接種後250人、3回目接種後97人

出典：審査報告書より改編

## ノバボックスワクチン接種対象者

1・2回目接種と3回目接種のいずれにおいても18歳以上の方  
※接種間隔などから、対象とならない場合があります  
4回目接種は対象外です


## 接種時期

8月上旬～  
（予定）

## 接種会場

市で会場（医療機関等）  
を割り振ります

## 接種までの流れ



新型コロナワクチン接種コールセンター

☎0772-66-3226（月～土）9：00～17：00



京丹後市 健康長寿福祉部 新型コロナウイルス対策室

☎0772-69-0135 8時30分～17時15分 土日・祝日除く



# 屋外・屋内でのマスク着用について

- マスク着用は従来同様、基本的な感染防止対策として重要です。  
一人ひとりの行動が、大切な人と私たちの日常を守ることに繋がります。
- 屋外では、人との距離（2m以上を目安）が確保できる場合や、距離が確保できなくても、会話をほとんど行わない場合は、**マスクを着用する必要はありません。**
- 屋内では、人との距離（2m以上を目安）が確保できて、かつ会話をほとんど行わない場合は、**マスクを着用する必要はありません。**



## 【屋外】

距離が確保できる

距離が確保できない

マスク必要なし

マスク着用推奨

会話を  
する



マスク必要なし

マスク必要なし

会話を  
ほとんど  
行わない



公園での散歩やランニング、サイクリングなど

徒歩や自転車での通勤など、屋外で人とすれ違う場面

## 【屋内】

距離が確保できる

距離が確保できない

マスク着用推奨

マスク着用推奨

会話を  
する



会話を  
ほとんど  
行わない

マスク必要なし

マスク着用推奨



通勤ラッシュ時や人混みの中  
ではマスクを着用しましょう

高齢の方と会う時や病院に行く時は、マスクを着用しましょう。  
体調不良時の出勤・登校・移動はお控えください。



夏場は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。

マスクに  
関するQ&A

